

ASSOCIATION DES DEUX-SÈVRES D'ÉTUDE ET D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE

7, Avenue de Limoges - 79008 NIORT CEDEX

SECTION ORNITHOLOGIE

CERCLE DES NATURALISTES
des Deux-Sèvres



Dépôt légal : 2ème trimestre 1981 - N° 2-81

Directeur de la Publication : A. GILLE
Rédaction : J.-M. BOUTIN

Imprimerie : ASSOCIATION DES USAGERS
DE LA MAISON POUR TOUS
7, avenue de Limoges NIORT.

Prix du numéro : 6 F.

SOMMAIRE



- ★ REPRODUCTION DU CANARD COLVERT
du FULIGULE MILOUIN & du GREBE HUPPE
dans le nord des DEUX-SEVRES en 1980
(M. Michel FOUQUET) 1 à 6

- ★ UN DORTOIR DE BERGERONNETTES GRISES
(M. Marcel AUDURIER) 7 - 8

- ★ NIDIFICATION DU CHEVALIER GUIGNETTE
(M. Hervé ROBREAU) 9

- ★ NIDIFICATION DU CORBEAU FREUX
dans la région de NIORT
(MM. Jean-Marie BOUTIN & Gaston BONNIN) 10 à 12

- ★ OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES
du 1er Octobre 1979 au 30 septembre 1980
(Synthèse J.M. CLAVERY) 13 à 30



NOTE SUR LA REPRODUCTION DU CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*), DU FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) et du GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) DANS LE NORD DES DEUX-SEVRES EN 1980.

Cette étude de la biologie de la reproduction du COLVERT, du MILOUIN et du GREBE HUPPE constitue pour ces espèces, à notre connaissance, les premières données quantitatives et qualitatives pour la région. C'est la raison pour laquelle, bien que ne concernant que l'année 1980, il nous a paru intéressant de les présenter ici.

I - SITUATION GEOGRAPHIQUE.

Située dans le haut bocage vendéen, aux confins de l'Anjou, la zone d'étude comprend 11 étangs concentrés dans un rectangle de 6 x 18 km à l'est d'ARGENTON-CHATEAU. La surface en eau de ces étangs à vocation piscicole, varie de 2 à 30 ha environ. Tous munis d'une bonde, ils sont vidangés et pêchés annuellement.

II - RECENSEMENT DES COUPLES NICHEURS.

Avant d'aborder la reproduction proprement dite, il nous paraît nécessaire de préciser les effectifs nicheurs des trois espèces et les méthodes utilisées pour chacune.

1) Canard colvert :

La méthode de recensement est inspirée de celle utilisée par TOURNIER en Dombes. Elle consiste à dénombrer les couples cantonnés pendant la période allant de la mi-février à fin mars, c'est-à-dire avant et au début de la période d'éclosion. C'est ainsi que pour l'ensemble de la zone, l'effectif nicheur a été estimé à 80 couples environ. L'espèce était nicheuse sur les 11 étangs.

2) Fuligule milouin :

Pour cette espèce, la structure peu marquée (voire éphémère) des couples, rend aléatoire la méthode utilisée pour le colvert. Le recensement des couples nicheurs se fait, toujours selon TOURNIER, par comptage des nichées observées. Ces dernières évoluent en général sur la surface d'eau libre et sont de ce fait particulièrement visibles. L'importante pression d'observation sur le secteur d'étude nous fait penser que la quasi totalité des nichées a été recensée, soit 41 nichées. L'espèce était nicheuse sur 7 des 11 étangs.

3) Grèbe huppé :

Les facilités d'observation pour cette espèce font que le recensement est probablement exhaustif. Les couples nicheurs sont en général assez nettement cantonnés et particulièrement pendant la période d'incubation. 33 couples ont été ainsi dénombrés et tout le cycle de la reproduction, du cantonnement à l'envol des jeunes, a pu être suivi. C'est ainsi que sur les 33 couples, 27 ont construit un nid et pondu, 19 ont obtenu l'éclosion et 11 seulement ont amené leur (s) jeune (s) à l'âge de l'envol. L'espèce était nicheuse sur 9 des 11 étangs.

III - RECENSEMENT DES NICHEES.

1) Méthode :

Pour les anatidés, un ou plusieurs points fixes d'observation sont choisis pour chaque étang qui est ainsi systématiquement "fouillé" aux jumelles ou au télescope, pour le repérage des nichées en notant pour chacune d'elles le nombre des poussins. L'âge de ces derniers est estimé en fonction de leur taille par rapport à la cane et de l'évolution de leurs duvet et plumes.

Pour les Grèbes huppés, le comportement des adultes nicheurs permet de localiser assez précisément l'emplacement du nid lorsque celui-ci n'est pas visible. L'éclosion est ainsi assez aisément détectée, ainsi que la sortie du nid. C'est d'ailleurs cette dernière qui a été retenue pour l'élaboration du calendrier. En effet, l'incubation débutant dès le premier oeuf, les éclosions sont échelonnées et la nichée ne quitte le nid qu'à la naissance du dernier poussin.

2) Nichées de Colvert :

60 nichées ont été dénombrées. Le calendrier des éclosions (figure 1) appelle plusieurs remarques :

- L'important étalement de la période d'éclosion qui se produit sur presque 4 mois (extrêmes 25 mars - 11 juillet, soit 110 jours). Ce phénomène a déjà été constaté chez le colvert, notamment par TOURNIER en Dombes qui l'explique par les pontes de remplacement consécutives aux aléas météorologiques post hivernaux.

- Une période de 40 jours sans pic net, allant du 10 avril au 20 mai pendant laquelle les éclosions sont les plus nombreuses (78 % du total).

3) Nichées de Milouin :

41 nichées ont été dénombrées. Le calendrier des éclosions (figure 2) présente un pic très net dans la 3ème décade de mai (44 % du total). On notera également une éclosion assez synchrone des nichées (extrêmes 15 mai - 23 juin, soit 40 jours).

4) Nichées de Grèbes huppés :

On retrouve pour le grèbe huppé (figure 3) un pic d'éclosion dans la 3ème décade de mai, analogue à celui du milouin. Ce pic représente 42 % du total des nichées écloses. Les éclosions sont en revanche plus étalées dans le temps (extrêmes 13 mai - 12 juillet) et semblent varier sensiblement d'un étang à l'autre.

IV - TAILLE DES NICHEES.

Le nombre des poussins est noté à la première observation de chaque nichée. Le tableau 1 résume pour chaque espèce la fréquence de ces nombres ainsi que la moyenne générale. Il faut cependant préciser que cette moyenne prend en compte des nichées d'âges assez différents, notamment pour le colvert chez lequel certaines familles sont décelées assez tardivement.

En retenant seulement les nichées observées à l'âge de 8 jours ou moins, on obtient les moyennes suivantes :

-Colvert	7,1 (pour 27 nichées)
-Milouin	5,8 (pour 30 nichées)

Certaines de ces nichées contactées à moins de 8 jours, ont été suivies jusqu'à l'envol (17 pour le colvert et 17 pour le milouin). Ce suivi nous permet une estimation de la mortalité pour ces 2 espèces :

- Colvert : 20 % dans le 1er mois, 4 % au delà
- Milouin : 17 % dans le 1er mois, 0 % au delà.

L'évolution des nichées de Grèbes huppés (figure 4) a pu être suivie de la sortie du nid à l'envol. Deux chutes de la moyenne du nombre de poussins par couples élevant sont perceptibles (l'une début juin, l'autre dans la 2ème décade de juin). Elles sont dues essentiellement à la conjugaison du dérangement humain prolongé (promenade en bateau) interdisant l'alimentation des jeunes, et des mauvaises conditions météorologiques.

Pour 19 couples élevant des jeunes, 43 poussins sont nés, mais 14 seulement sont arrivés à l'âge de l'envol (soit 65,7 % de mortalité);
 8 couples sur 19 ont vu leurs nichées décimées en cours d'élevage,
 9 couples ont amené 1 seul jeune à l'envol,
 1 couple a élevé 2 jeunes et 1 couple 3 jeunes.

V - CONCLUSION.

Ces quelques données sur la reproduction du colvert, du milouin et du grèbe huppé dans les DEUX-SEVRES ne peuvent se comparer qu'à elles-mêmes en l'absence de références antérieures pour la région. Elles dessinent néanmoins des tendances qui devront être confirmées par un suivi sur plusieurs années, lequel devra s'efforcer de mettre en évidence les relations écologiques Anatidés-Etangs.

Michel FOUQUET

Cercle des Naturalistes des Deux-Sèvres
 - Section Ornithologie -

VOIR CI-APRES TABLEAUX ET FIGURES ANNEXES.

TABLEAU I - NOMBRE DE POUSSINS PAR NICHEE

COL VERT - 57 Nichées

Nombre POUSSINS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nombre NICHEES	1	6	5	5	5	3	5	7	7	6	6	1	-	-

Moyenne : 6,7

MILOUIN - 40 Nichées

Nombre POUSSINS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nombre NICHEES	5	5	3	4	4	6	2	6	1	3	-	-	-	1

Moyenne : 5,3

GREBE HUPPE - 19 Nichées

Nombre POUSSINS	1	2	3	4
Nombre NICHEES	4	8	5	2

Moyenne : 2,3

TABLEAU 2 - REPARTITION DES NICHEES PAR ETANG

	COL VERT	MILOUIN	GREBE HUPPE
JUIGNY.....	7	5	6
MIREMONT.....	1	0	2
LA GRUE.....	20	9	1
GRIFFERUS.....	2	0	1
MAGNY.....	4	3	0
BRUNETIERES.....	3	5	2
AUDEFOLS.....	3	0	2
REPENOU.....	3	3	0
GRIPPIERE.....	4	0	3
BEAUREPAIRE.....	2	5	1
MAUMUSSON.....	11	11	1

CALENDRIER DES ECLOSIONS DU CANARD COLVERT 1980

FIGURE 1





FIGURE 2

CALENDRIER DES ECLOSIONS DU FULIGULE MILOUIN - 1980



CALENDRIER DES ECLOSIONS DU GREBE HUPPE - 1980

(19 NICHEES)

FIGURE 3

NOMBRE DE NICHEES

20

15

10

5

NOMBRE CUMULE
DES ECLOSIONS

20

16

12

8

4

COURBE CUMULEE
DES ECLOSIONS

DECADES D'ECLOSTON

1/5

2/5

3/5

1/6

2/6

3/6

1/7

2/7

3/7

EVOLUTION DES NICHEES DE GREBES HUPPES

FIGURE 4

NOMBRE DE POUSSINS
MOYENNE/COUPLES ELEVANT

NOMBRE CUMULE
DES ECLOSIONS

3

2.5

2

1.5

1

0.5

COURBE CUMULEE
DES ECLOSIONS

20

15

10

5

20/5
2/6

6/6

13/6

21/6

27/6

4/7

10/7

21/7


28/7

4/8

11/8

18/8

DATE D'OBSERVATION



OBSERVATIONS FRAGMENTAIRES

D'UN DORTOIR DE BERGERONNETTES GRISES

(Motacilla alba)

La gare de la S.N.C.F. à NIORT et son voisinage immédiat constituent le site.

Le dortoir principal est installé dans un laurier palme dont la forme schématise un cône, pointe en bas, de 4 m de hauteur. Accessoirement, l'hébergement gagne une toiture proche.

L'endroit est fort bruyant et animé, enclavé entre les voies urbaines et les chemins de fer. Des voitures automobiles stationnent souvent au contact même de l'arbuste. Toute la zone est abondamment éclairée la nuit.

°
° °

Les premières arrivées commencent par l'apparition de quelques individus isolés; puis une accélération rapide se produit et les bandes qui au début ne rassemblent pas plus de 5 participants vont jusqu'à réunir plus de 15 oiseaux. Elles paraissent issues de toutes les directions. L'altitude moyenne des vols a été estimée à 20-30 mètres.

De manière très constante, les bergeronnettes s'arrêtent en premier lieu sur les immeubles environnants les plus élevés, dans un rayon d'une cinquantaine de mètres. Tantôt picorant, tantôt immobiles sur les arêtes ou rebords, elles y séjournent un moment sans exclure des déplacements d'une station à l'autre. Finalement, elles se rapprochent du dortoir en venant s'installer sur les toits les plus proches où ces rassemblements de plusieurs centaines de congénères ont pu être observés; encore bien qu'ils semblent marquer une prédilection pour les pentes de toitures non visibles du sol.

La pose directe dans l'arbuste est extrêmement rare.

°
° °

Les premières arrivées coïncident étroitement avec l'heure de coucher du soleil. Elles précèdent d'environ 1/2 heure les premières poses dans le laurier. Une autre 1/2 heure s'écoule encore jusqu'à la dernière entrée au dortoir. On a du reste noté que le déclenchement maximum des vols est concomitant avec la mise en lumière des réverbères.

L'accès au dortoir s'effectue principalement selon deux allures différentes :

1) Par piqués très raides, presque verticaux de la part d'oiseaux arrivant en surplomb et freinant leur chute par quelques extensions d'ailes,

2) Au moyen d'un parcours voisin de l'horizontale, assorti d'une remontée finale à hauteur du laurier.

Les poses s'effectuent surtout dans la partie supérieure des ramures, à la pointe extrême des tiges et des feuilles. L'oiseau volète sur place, queue baissée à la verticale, ailes écartées en croix, tête légèrement inclinée, repérant un endroit disponible à quelques centimètres en dessous. Les essais sont souvent multiples et provoquent un certain tourbillonnement au périmètre du feuillage. Peu de temps après, les arrivants perchés descendent à l'intérieur de l'abri, hors la vue. Néanmoins, lors des fortes affluences des oiseaux demeurent, en nombre, apparents à l'extérieur, sans mouvement même dans le faisceau des phares.

Pendant toute la durée de l'installation, les hôtes se chamaillent et émettent des appels variés. Puis s'instaure un calme complet.

Lorsque la capacité d'accueil est dépassée, le surplus de la troupe se réfugie sur les pentes des toitures de la gare et du quai formant un V ouvert en direction du ciel. Les bergeronnettes paraissent y être attirées par une bande de couverture en plastique ondulé formant verrière. Eclairée (chauffée ?) par les lampes du quai, cette surface transparente a permis d'effectuer des comptages. Cependant, la répartition réelle des oiseaux n'a pu être vérifiée au-delà.

°
° °

La permanence du dortoir a été établie de façon continue tout au long d'une période de 12 mois (Décembre 1979 à Décembre 1980). Les plus fortes fréquentations ont été relevées lors des basses températures hivernales (+ de 700 en janvier 1979 (1), une décroissance régulière s'est produite ensuite jusqu'à la limite de 5 individus (10 juillet 1980); puis dès août, les retours ont progressé (70 le 9 août, 150 le 14 août). Ils comprenaient alors une forte proportion de juvéniles (90 %) qui adoptaient les mêmes comportements que les adultes. On peut penser que les rares oiseaux revenant au dortoir en juillet jouent un rôle d'amorçage. Alors que le 9 septembre 1980 on dénombrait 270 visiteurs, ce chiffre tombait à 29 le 16 octobre après un mois remarquable d'enseulement et de chaleur.

L'affluence a repris par la suite. On évaluait à près de 800 le nombre de bergeronnettes ralliant le site au 3 décembre 1980.

°
° °

Aucune pose n'a jamais été constatée dans les petits conifères jouxtant le laurier.


Aucun cadavre d'oiseau n'a été retrouvé sous le dortoir.

Outre les bergeronnettes grises, on a observé quelques yarrell et une flava, tandis que l'absence totale de cinerea se remarquait.

Aucune autre espèce n'a été vue s'incorporer au dortoir.

Marcel AUDURIER

(1) Chiffre très certainement inférieur à la réalité.



REMARQUE SUR UNE TENTATIVE DE NIDIFICATION
DU CHEVALIER GUIGNETTE *TRINGA HYPOLEUCOS*

Le 28 avril 1980, 2 chevaliers guignette sont observés sur le canal du Mignon au lieu dit "Le Moulin Neuf" à MAUZE. Le recalibrage et le nettoyage des berges du canal ont mis à nu des plages de vase, et cela semble être de bonnes zones nourricières.

Le 4 mai, des comportements de défense de nid étaient observés : cris d'alarme, envol au dernier moment, l'oiseau se pose à une vingtaine de mètres en lançant toujours un cri d'alarme et revient aussitôt sur l'endroit supposé du nid dès que l'intrus est parti.

Cette supposition devenait réalité lorsque fut découvert le nid. Ce dernier, rudimentaire, était placé approximativement à 40 cm du rivage et à 30 cm au-dessus du niveau de l'eau, à l'entrée d'un vieux trou de rat musqué *Ondatra zibethicus*. Une petite cuvette grossièrement tapissée de feuilles et de débris végétaux contenait 2 oeufs.

Le même jour, 4 autres individus aperçus au même endroit, furent revus à 5 km du canal.

Une semaine plus tard, les oeufs avaient disparu (pas de débris de coquille, même dans l'eau); prédation supposée par un rat musqué, cette espèce étant abondante dans ce milieu.

Le 3 juin, seuls, 2 individus étaient présents sur une position de 5 km du canal. Une semaine plus tard, aucun individu n'était observé sur 15 km.

Hervé ROBREAU

Conclusion : Ces observations laissent supposer que le CHEVALIER GUIGNETTE dont on n'avait aucune preuve de nidification dans le bassin de la Sèvre Niortaise où il n'est pas rare peut, exceptionnellement semble-t-il, nicher dans notre département. De nouvelles observations seront nécessaires pour établir ce fait.

Complément sur la nidification du CORBEAU FREUX
dans la Région de NIORT.

Corbeautière	Nombre de nids	
	1979	1980
La Brèche - Niort	15	le même nombre (détruits par les pompiers)
Ste Pezenne - Niort	18	21
Rue de Grange - Niort	40	43
Pré Le Roy - Niort	6	11
Noron - Niort	238	300
Sevreau - Magné	12	8
Peigland - Coulon	56	65
Les Habites - St Maxire	20	20
Mauzay - Echiré	20	5
Salbart - Echiré	0	13
TOTAL :	425	486


Ces chiffres traduisent une légère augmentation, celle-ci étant particulièrement marquée au niveau de la colonie principale de NORON (25 % d'augmentation de 1979 à 1980).

En collaboration avec les Groupes appartenant à l'UNION CENTRE ATLANTIQUE des Groupes Ornithologiques, un recensement complet des corbeautières sera effectué au printemps 1981.

Dans la mesure au possible, un essai de recensement des dortoirs de corbeaux sera tenté avant la fin janvier 1981.

J.M.C. & J.M.B.

AH ! LES AFFREUX FREUX !



M. CLAVERY

Avant la guerre, celle de 1939-1945, les Freux ne nichaient pas encore dans notre région. C'étaient des visiteurs d'hiver, dont les marées noires déferlant au centre et à l'est de l'Europe, occasionnaient des dégâts parfois sérieux aux céréales naissantes.

Aujourd'hui, le corbeau freux se sédentarise et s'implante solidement dans notre département. Mais pourquoi, alors qu'il y a tant de place dans la vallée de la Sèvre, veulent-ils nidifier en pleine ville de NIORT ? Peut-être s'y sentent-ils à l'abri des coups de fusil ?

Les pionniers aventureux qui, depuis trois ans ont entrepris de nicher dans les platanes de la place de la Brèche et de l'avenue de Paris, ont beaucoup fait parler d'eux. C'est qu'ils devenaient insupportables : pollution sonore, nocturne par surcroît, empêchant les riverains de dormir ; pollution aérienne constellant d'éclaboussures les voitures garées sous les arbres.

Il fallait faire quelque chose, mais quoi ? Abattre les arbres ? Holdà ! D'autre part, on voyait mal l'ACCA de NIORT organiser une battue aux nuisibles au coeur de la ville.

Monsieur Le Maire décida de faire intervenir les pompiers. Une première expérience fut décevante. Dénichés "manu pompiéri" à l'aide de la grande échelle, les corbeaux têtus reconstruisirent leurs nids en quelques jours. Il était plus raisonnable de céder...

Le printemps 80 vit la déroute des Freux qui avaient choisi de passer leur lune de miel en ville.

L'état-major des pompiers niortais avait mis au point une logistique parfaitement adaptée. Les corbeaux trempés, dégoûtés et découragés, vidèrent les lieux avec des clameurs d'indignation.

J'en rencontrai un qui, une aile en berne et boitant bas, remontait lentement l'allée centrale du parking de la Brèche. Je m'approchai pour lui adresser quelques paroles de compassion. Il me regarda d'un oeil méfiant, se réfugia un instant derrière une vasque de pensées, puis repartit clopin-clopant vers un destin aussi sombre que son plumage.

Une semaine plus tard, un "ornitho" qui suivait le quai de la Préfecture, un oeil sur la rivière et l'autre sur le parc, s'arrêta net : "C'est pas vrai !" Et si ! Ils étaient là, s'affairant et jacassant au faite des hauts platanes départementaux.

"Bon ! se dit notre observateur, ils ne sont pas contents et viennent faire une "Manif" à la Préfecture, c'est normal, tout le monde sait que les corvidés sont des oiseaux futés."

Mais il s'agissait en fait d'une véritable occupation et en très peu de jours une dizaine de nids étaient édifiés sur les plus hautes branches. Les Freux, indésirables sur le plan municipal, étaient venus se mettre sous la protection de Monsieur Le Préfet... et Jean de La Fontaine voulait nous faire croire que ces oiseaux étaient stupides !

Qu'allait-il se passer ? Ces téméraires corvidés seraient-ils encore viâés (1) de cet ultime refuge ?

Ils le furent en effet, sans tarder, sur réquisition des pompiers.

Expulsion amplement motivée par la Réglementation : espèce figurant sur le tableau des oiseaux nuisibles, bruyante et polluante et qui pousse l'incongruité jusqu'à venir croasser dans le périmètre de protection de l'église Notre-Dame, tolérance accordée seulement aux Choucas, oiseaux autochtones plus discrets. La chronique freuxienne serait-elle tarie ?

Est-ce la fin d'une tentative hasardeuse ?

Attendons avec curiosité le printemps 81.

G. BONNIN

(1) Pardon pour ce croâlembour inévitable.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

1er Octobre 1979 - 30 Septembre 1980

=====



Afin de faciliter la synthèse des observations, il s'avère impératif que les observateurs nous fassent parvenir leurs données semestriellement. (Avant le 31 juillet pour le premier semestre, et avant le 31 janvier pour le 2ème semestre.

★OBSERVATIONS à adresser chez Jean-Marie CLAVERY
21 bis, rue du Fief Trochet
79000 NIORT

★OBSERVATEURS : M. AUDURIER (M.A.), G. BONNIN (G.B.), J.M. BOUTIN (J.M.B.)
J.M. CLAVERY (J.M.C.), M. FOUQUET (M.F.), J.M. HOUMEAU,
J. THULEAU, G. Van LAERE (G.V.L.), M. METAIX, P. PHILIPPON
(Groupe Angevin d'Etudes Ornithologiques), GUERIN J.C.

Synthèse : J.M. CLAVERY.



PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*)

8.12.79 : 1 individu à Juigny (M.F.)

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*)

Observé toute l'année sur différents étangs. A noter les rassemblements suivants :

1.10.79 : 10 individus à Juigny (M.F.)
9.3.80 : 20 " " "
31.7.80 : 1 " plan d'eau du Lambon (G.B.)
17.9.80 : 16 " à Juigny (M.F.)

Pour la nidification de cette espèce, voir l'article de M. FOUQUET.

OIE CENDREE (*Anser anser*)

Nombreuses observations sur l'ensemble du département.

- 17.10.79 : 3 vols à St Germain de Longue Chaume (J.M.B.)
11.11.79 : 46 individus en vol à Faye sur Ardin (J.M.B.)
13.12.79 : 80 envols (S-SW) à Juigny (M.F.)
31.12.79 : 49 individus en vol (S-N) à Benêt (J.M.C.)

Migration printanière du 13 février au 20 Mars.

- 20.2.80 : 50 individus en vol à Niort (M.A.)
29.2.80 : 345 " stationnés à Juigny (M.F.)
 250 " " la Grue (M.F.)
 210 " " Repenou (M.F.)
7.3.80 : 240 " " Juigny (M.F.)
 38 " " la Grue (M.F.)
 76 " " Beaurepaire (M.F.)
13.3.80 : 200 " en vol à Niort (J.M.C.)
27.4.80 : 1 individu bec rose, forme orientale, non baguée, farouche à Juigny (M.F.)
5.5.80 : 1 " " " à la Brunelière (M.F.)
3.5.80 : 1 " pendant 1 journée à Périgné (J.C.Guérin)

ANATIDES (voir recensement B.I.R.S. Janvier-Mars 1980)

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)

Quelques observations du 13.1.80 au 24.3.80 à Juigny (M.F.)

- 12.1.80 : 2 individus à Maumusson (M.F.)
13.1.80 : 7 " Juigny (M.F.)
16.3.80 : 1 " " (J.M.B., G.V.L., M.A., M.F., J.M.C.)

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*)

Présent toute l'année.

- 12.1.80 : 29 individus étang de la Grue (JMB, MF, JMC)
 135 " " la Gripière (M.F.)
 80 " " Etusson (M.F.)
20.1.80 : 160 " Juigny (M.F.)

Pour la nidification de cette espèce, voir l'article de M. FOUQUET.

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)

Présente du 6.10.79 au 25.4.80 sur les étangs (maximum 180 individus du 1er au 8 décembre 1979 à Juigny (M.F.)

- 18.11.79 : 1 individu à Courberive (J.M.B.)
18.4.80 : 1 couple à Brunetière (M.F.)
25.4.80 : 1 " " "

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*)

- 1ère observation : 17.3.80 1 ♂ à Juigny (M.F.)
 24.3.80 1 ♂ + 2 ♀ à la Grue (M.F.)
Dernière observation : 25.8.80 1 individu à Juigny (M.F.)

Pas de reproduction cette année.

CHIPEAU (*Anas strepera*)

Espèce observée du 1.11.1979 au 30.9.1980 à Juigny (M.F.)

- 15.11.79 : 32 individus à Juigny (M.F.)
2.12.79 : 1 ♂ à la Guyonnière (J.M.B.)

30.3.80 : 1 couple à Juigny (M.F.)
5.5.80 : 1 " Brunelière (M.F.)
27.6.80 : 1 " la Grue (M.F.)

CANARD SIEFLEUR (*Anas penelope*)

Observé du 3.11.1979 au 13.4.1980 à Juigny (M.F.)

3.11.79 : 17 individus à Juigny (M.F.)
7.3.80 : 2 ♂ et 1 ♀ " "

CANARD FILET (*Anas acuta*)

Observé du 12.1.80 au 24.3.80 à Juigny (M.F.)

9.5.80 : 1 couple étang de la Brunetièrre (M.F.)
16.9.80 : 3 individus dont 1 ♂ adulte à Beurepaire (M.F.)

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)

Espèce présente toute l'année.

11.11.79 : 49 individus à Juigny (M.F.)
7.3.80 : 33 " la Grue (M.F.)
16.3.80 : 28 " (210 ♂, 70 ♀) à La Grue (M.F.)

Pas de reproduction cette année.

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)

Observé toute l'année sur les étangs du nord des Deux-Sèvres.

1.11.79 : 82 individus à Juigny (M.F.)
1.12.79 : 86 " " "
14.7.80 : 45 " la Grue (M.F.)
29.9.80 : 34 " Beurepaire (M.F.)

Pour la nidification de cette espèce, voir l'article de M. FOUQUET.

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)

Observé toute l'année sur l'étang de Juigny (M.F.)

17.11.79 : 14 individus à Juigny (M.F.)
du 5.5.80 au 24.5.80 : 1 ♂ parade avec les milouins à Juigny (M.F.)
19.7.80 : 1 ♂ éclipsé à Juigny (M.F.)
17.9.80 : 2 individus à Juigny (M.F.)

GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*)

Présent du 1.11.79 au 20.4.80 à Juigny (M.F.)

17.11.79 : 4 individus (1 ♂ adulte) à Juigny (M.F.)
12.1.80 : 1 " ♀ à Juigny (JMB, MF, JMC)
1.3.80 : 3 " (♀ ou imm.) à Juigny (M.F.)
du 25.3.80 au 20.4.80 : 1 ♀ imm. à Juigny (M.F.)

HARLE PIETTE (*Mergus albellus*)

12.1.80 : 1 individu ♀ à la Grue (JMB, MF, JMC)
13.1.80 : 1 " " Juigny (M.F.)
17.2.80 : 1 " " La Grue (M.F.)

HARLE BIEVRE (*Mergus merganser*)

31.12.79)
1.1.80) 2 individus (♀ ou imm.) à Juigny (M.F.)

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*)

Nombreuses observations sur l'ensemble du département.

19.11.79 : capture d'un individu blessé par plomb à La Roussille, nourrissage, puis relâché le 27.11.79 à Chizé (J.M.B.)

21.4.80 : 1 individu à Niort (J.M.B.)

19.7.80 : 1 ♂ avec 1 étourneau dans les serres à Juigny (M.F.)

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)

Observée toute la saison sur l'ensemble du département.

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*)

17.3.80 : 1 individu attaqué par 16 corneilles, 3 étourneaux, 2 busards des roseaux au Parc Challon (M.F.)

24.4.80 : 1 individu en chasse à Gripière (M.F.)

10.7.80 : 1 " attaqué par 3 crécerelles, corneilles et pies à Juigny (MF)

4.8.80 : 1 ♀ adulte attaquée par 3 " et 2 corneilles à Juigny (M.F.)

24.9.80 : 1 individu à Chizé (J.M.B.)

Nicheur possible au Parc Challon (Juigny (M.F.))

MILAN NOIR (*Milvus migrans*)

Observé sur tout le département du 12 mars 1980 au 2 Septembre 1980.

12.3.80 : 1 individu à Chizé (J.M.B.)

2.9.80 : 2 " Juigny (M.F.). Ce stationnement aussi tardif correspond à une mortalité énorme de lapins autour de l'étang dont les milans ont fait l'essentiel de leur nourriture du 15.8 au 2.9.

Observation la plus tardive enregistrée les années précédentes : 17.8.79 (M.F.)

Couples nicheurs recensés : 2 couples à Juigny, 1 Parc Challon, 1 bois Chauvy, 1 bois de Beaurepaire, au moins 2 bois de la Couarde, au moins 1 bois d'Etusson + 1 probable près de la Grue et 1 probable près de Repenou (M.F.)

1 couple nicheur au Grand May à Aiffres (M.Métais)

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)

3.10.79 = 1 individu à Granzay-Gript (J.M.B.)

4.10.79 : 1 " perché sur un orme à Faye sur Ardin (J.M.B.)

14.10.79: 4 " en migration à Juigny (M.F.)

21.10.79: 1 " à Triaize (85) (J.M.B.)

BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*)

Nombreuses observations du 20.4.80 au 28.9.80.

27.4.80 : 1 individu en migration à Faye sur Ardin (J.M.B.)

18.7.80 : 1 " à St Généroux (J.M.B.)

2.8.80 : 6 " à Juigny (M.F.)

31.8.80 : 7 " attaquant un circaète Jean le Blanc (M.F.)

Couples nicheurs recensés : 1 Parc Challon, 1 Bois Chauvy, 1 Bois de Beaurepaire, 1 Bois d'Anjou (M.F.)
1 réserve de Chizé (J.M.B.)

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)

Nombreuses observations sur les étangs du nord du département.

Couples nicheurs recensés pour 1980 (M.F.) :

Juigny : 1 ♂ 3 hiverns polygamme (avec 1 ♀ adulte - 2 juvéniles le 26.7 volants
 (avec 1 ♀ " ? échec probable (chasse)
 : 1 ♂ 2 hiverns avec 1 ♀ immature ? " " "
 La Grue : 1 ♂ 3 " avec 1 ♀ adulte - éclosion mais pas vu jeunes.
 Brunetières :
 1 ♂ 3 hiverns polygamme (avec 1 ♀ adulte - 3 juvéniles le 14.7 volants
 (avec 1 ♀ " - 2 " sur le nid le 20.7
 Maumusson : 1 ♂ adulte avec 1 ♀ " - éclosion mais pas vu jeunes.

BUSARD SAINT MARTIN (*Circus cyaneus*)

Nombreuses observations dans l'ensemble du département.

13.10.79 : 1 ♀ ou imm. à Juigny (M.F.)
 1.3.80 : 1 individu à Mazières (M.A.)
 18.7.80 : 1 couple et 2 juvéniles à St Géréroux (J.M.B.)

Quelques nidifications probables au Parc Challon, Grifférous, étang de la Grue, Bois Chauvy, Bois de Beaurepaire, forêt d'Etusson.

BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*)

Plusieurs observations dans l'ensemble du département du 13.4.80 au 25.8.80.

13.4.80 = 1 ♀ au vol à Faye sur Ardin (J.M.B.)
 27.4.80 : 1 ♀ plaine de Doux (G.B.)
 11.8.80 : 1 ♀ ou imm. de forme mélanique à Repenou (M.F.)
 25.8.80 : 1 juvénile à Beaurepaire, la Grue et Brunetières (M.F.)
 + 5 couples (minimum) sur la plaine d'Aiffres, Prahecq, Vouillé pendant tout l'été (M. Métais)

CIRCAETE JEAN LE BLANC (*Circaetus gallicus*)

Quelques observations à Chizé et dans le nord des Deux-Sèvres du 8.4.80 au 15.9.80.

8.4.80 : 1 individu vole sur place au Parc Challon (M.F.)
 23 & 24.4.80 : 1 ♀ couve sur un nid à Chizé (J.M.B.)
 28.4.80 : le ♂ couve sur le nid (J.M.B.)
 31.8.80 : 1 individu attaqué par 7 bondrées (M.F.)

Nicheur possible au Parc Challon (M.F.)

BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*)

24.5.80 : 1 individu à Juigny (M.F.)

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*)

11.79 : 1 individu au vol à Béceleuf (J.M.B.)
 30.3.80 : 1 individu immature, 1ère année trouvé mort (?) plaine de St Liguairé (Anthonioz)

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*)

10.11.79 : 1 individu à Faye sur Ardin (J.M.B.)
 12.1.80 : 1 " en chasse à Ardin (J.M.B., J.M.C.)

FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*)

Plusieurs observations dans le nord du département du 27.4.80 au 29.9.80.

1.10.79 : 1 immature à Juigny (M.F.)
 11.4.80 : 1 individu paradant à Faye s/Ardin (J.M.B.)
 2.5.80 : 2 ♂ se battant " "
 2.6.80 : 1 individu à la Grue (M.F.)
 14.6.80 : 1 ♂ à Gascougnolles (M.Métais)
 1.9.80 : 1 individu à Béceleuf (M.A.)
 13.9.80 : 1 couple à Prahecq (M.Métais)

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*)

- 20.1.80 : 1 individu tué à Faye sur Ardin (J.M.B.)
18.5.80 : 1er chanteur à Juigny (M.F.)
6.6.80 : chanteurs à Ste Blandine (J.M.B.)
12.8.80 : dernier chanteur à Juigny (M.F.)
Plusieurs observations à Aiffres-Prahecq (M.Métais)

GRUE CENDREE (*Grus grus*)

- 24.10.79 : vol de 200 à 300 individus à Chizé (J.M.B.)
entendu autre vol vers 23 h à Chizé (J.M.B.)
26.10.79 : 48 plus 7 individus Nord-Sud à Chizé "
3.3.80 : 1 vol à Périgné (J.C.Guérin)
21.3.80 : 8 individus en vol vers le nord à St Germier (J.M.B.)

RALE DES GENETS (*Crex crex*)

- 21.9.80 : 1 individu à Béceleuf (M.A.)
28.9.80 : 1 " entendu à Ardin (M.A.)

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*)

Très nombreuses observations sur les étangs du nord du département.

- Du 18.10 au 2.11.79 : 110 individus à Juigny (M.F.)
17.11.79 : 180 individus à Juigny (M.F.)
18.11.79 : 4 " étang de Courberive (J.M.B.)
14.7.80 : 520 " à Juigny (M.F.)
18.8.80 : 270 " à la Grue "
29.9.80 : 720 " à Beaurepaire (M.F.)

OUTARDE CANEPETIERE (*Otis tetraz*)

- 17.1.80 : 2 individus à Faye s/Ardin (revues les 2 le 19 et 1 le 20.1.80)(JMB)
8.3.80 : 1 " Coulon (J.M.B.)
22.3.80 : 1 ♀ à St Pompain (J.M.C.)
12.5.80 : 2 ♂ se poursuivant à Aiffres (M.Métais)
30.5.80 : 1 ♂ à Ardin (J.M.C.)
26.9.80 : 167 individus à Ste Blandine (J.M.B.)
77 " à Triou "
13 " à Ste Eanne e

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*)

Plusieurs observations du 22.12.79 au 24.3.80 dans l'ensemble du département.

- 22.12.79 : 500 individus à Ste Blandine (J.M.B.)
145 " à Juigny + nombreux passages S/S.O. (M.F.)
du 23.12.79 au 12.1.80 : stationnement important à Juigny (M.F.)
28.12.79 : 600 individus
1.1.80 : 120 "
12.1.80 : 100 "
24.3.80 : 5 individus en vol vers le nord-est à Juigny (M.F.)

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*)

Très nombreuses observations et stationnement important dans tout le département.

- ex. : 24.12.79 : 4.000 individus stationnés à Juigny (M.F.)
12.1.80 : 5.000 " " Genneton (M.F.)

Nidification à Magny, Juigny.

- 23.5.80 : 4 couples à Magny (coît) (M.F.)
2 " Juigny

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*)

Plusieurs observations du 26.4.80 au 28.7.80 à Juigny, Magny, Beaufrepère (M.F.)

- 30.5.80 : 1 couple avec chant et vol nuptial à Magny (M.F.)
6.6.80 : 1 " à Beaufrepère (M.F.)
2 individus dont 1 alarquant à Magny (M.F.)
1 " à Juigny (M.F.)
27.6.80 : 2 " avec 4 pulli d'une semaine environ à Magny (M.F.)
4.7.80 : 1 couple " " " " " " " "

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*)

Plusieurs observations en mars, mai et septembre sur les étangs du nord

- 17.3.80 : 1 individu à Juigny (M.F.)
9.5.80 : 7 " à Magny "
1 " à Juigny "
15.9.80 : 3 " à la Grue "
29.9.80 : 1 " à Gripière (M.F.)
1 " à Beaufrepère "

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*)

- 18.11.79 : 14 individus en vol à Courberive (J.M.B.)
2.12.79 : 6 " à l'étang de la Guyonnière (J.M.B.)
21.3.80 : 2 " à St Germier (J.M.B.)

Très nombreuses observations sur les étangs du nord du département.

- Ex. : 26.12.79 : 14 individus à Juigny (M.F.)
17.3.80 : 19 " " "
18.8.80 : 8 " à la Grue "
4 " à Magny "
29.9.80 : 12 " à Beaufrepère (M.F.)
3 " à Magny (M.F.)
4 " à La Grue "
1 " à Juigny "

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*)

- 28.10.79 : 1 individu à la Garenne (J.M.B.)
30.12.79 : 20 " levées à la chasse (J.Thuleau)
6.1.80 : 8 " " " " "

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*)

- 2.11.79 : 4 individus en vol vers le sud-ouest à Juigny (M.F.)
18.11.79 : 1 " à Juigny (M.F.)
12.1.80 : 1 " à Maumusson (M.F.)
30.3.80 : 1 " en vol vers le nord-est à Juigny (M.F.)
6.5.80 : 8 " à Ardin (J.M.C.)
23/25.8.80 : 3 " à Juigny (M.F.)

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*)

- 27.4.80 : 2 individus en vol vers le nord à Juigny (M.F.)
1.5.80 : 7 " " " " "
16.9.80 : 1 " à Juigny (M.F.)

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*)

Présente sur les étangs du nord du 1.3.80 au 1.9.80.

- 1.3.80 : 50 individus en vol vers le nord à Juigny (M.F.)
19.4.80 : 19 " à Juigny (M.F.)
26.6.80 : 4 " " "
27.6.80 : 1 " à la Grue "
1.9.80 : 1 " à Miremont "

CHEVALIER CUL BLANC (*Tringa ochropus*)

Présent du 25.11.79 au 30.9.80 sur les étangs du nord.

30.11.79 : 3 individus à Juigny (M.F.)
12.1.80 : 3 " à Magny (JMB, M.F., JMC)
25.8.80 : 10 " à Juigny (M.F.)
7 " à Magny (M.F.)
5 " à Beurepaire (M.F.)

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*)

1.1.80 : 1 individu à Niort (Noron) (J.M.B.)
1.5.80 : 5 " à Magné (J.M.C.)
17.5.80 : 11 " à Juigny (M.F.)
31.7.80 : 4 " au plan d'eau du Lambon (G.B.)

Nidification certaine à Mauzé s/le Mignon, voir article H. ROBREAU.

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)

Nombreuses observations du 17.3.80 au 25.8.80 sur les étangs du nord.

8.4.80 : 1 individu chanteur à Juigny (M.F.)
16.5.80 : 3 " " " "
25.8.80 : 1 " à Beurepaire (M.F.)
1 " en vol sur Niort (J.M.B.)

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*)

Quelques observations du 18.4.80 au 30.9.80 sur les étangs du nord

Ex : 25.4.80 : 4 individus à Beurepaire (M.F.)
1 " à Magny (M.F.)
16.9.80 : 12 " à Beurepaire (M.F.)
1 " à La Grue (M.F.)
1 " à Repenou (M.F.)
25.9.80 : 1 " à Grippièrre (M.F.)
7 " à Beurepaire (M.F.)

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)

Présent du 4.4.80 au 30.9.80 sur les étangs du nord.

4.4.80 : 4 individus à Beurepaire (M.F.)
25.4.80 : 14 " à Magny (M.F.)
7 " à Juigny (M.F.)
8 " à Beurepaire (M.F.)
1 " à Grifférus (M.F.)
16.9.80 : 3 " à Beurepaire (M.F.)

CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*)

25.4.80 : 17 individus à Juigny (1 o 16 ♀) (M.F.)
2 " à Magny (M.F.)
2 " à La Grue (M.F.)
28.7.80 : 1 o avec reste de plumage nuptial à Magny (M.F.)
16.9.80 : 2 individus à Beurepaire (M.F.)

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*)

28.7.80 : 1 individu à Juigny (M.F.)
4.8.80 : 1 " à Magny "
2 " à Beurepaire (M.F.)
11.8.80 : 1 " " "
2 " à Magny "
1 " à Juigny "
18.8.80 : 1 " à Beurepaire "
25.8.80 : 1 " " "

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)

6.10.79 : 1 individu à Juigny (M.F.) ainsi que le 8.12, 23.12, 24.12.79,
17.3.80.
11.11.79 : 1 individu à La Grue (M.F.)
18.4.80 : 3 " à Magny "
9.5.80 : 2 " " "

BECASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*)

1.9.80 : 1 individu à Beaurepaire (M.F.) idem le 29.9.80.

OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oedicnemus*)

5.10.79 : 10 individus à Juigny (M.F.)
19.3.80 : 1 " à Ste Eanne (J.M.B.)
29.3.80 : 3 " à Ste Blandine (J.M.B.)
5.5.80 : 5 " à Ardin (J.M.C.)
13.9.80 : 100 " (dortoirs) à Vouillé (M.Métais)

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)

19.5.80 : 2 couveuses à Brunetières (M.F.)
23.5.80 : 6 " " "
1 " à Magny "
30.5.80 : 4 " à Brunetières " idem le 2.6.80
13.6.80 : 2 " " "
4.7.80 : 9 individus avec 1 pulli de 15 jours et 2 pulli de 3 semaines
à Brunetières (M.F.)

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*)

18.4.80 : 1 adulte en plumage nuptial à Magny (M.F.)
12 & 13.9.80 : 7 individus (1 ad. / 6 juv.) à Juigny (M.F.)

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*)

Ex : 16.5.80 : 1 individu à Juigny (M.F.)
10.7.80 : 4 " (2 ad. + 2 juv.) à Juigny (M.F.)
30.8.80 : 5 " à Juigny (M.F.)

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*)

Plusieurs observations du 25.4.80 au 20.9.80 sur les étangs du nord.

27.4.80 : 6 individus à Juigny (M.F.)
2.8.80 : 10 " " "
19.9.80 : 5 " " "

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*)

Plusieurs observations du 13.4.80 au 15.5.80 à Juigny (M.F.)

Ex. : 13.4.80 : 4 individus
5.5.80 : 9 "
10.5.80 : 12 "

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*)

10.1.80 : 11 individus à Ardin (J.M.C.)
4.4.80 : 1 " à Juigny (M.F.)
30.6.80 : 15 " Carrière de Viennois (J.M.B., J.M.C.)
4.7.80 : 1 " à Repenou (M.F.)
25.8.80 : 2 " à Repenou (M.F.)

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*)

29.4.80 : 20 individus à Gript (J.M.B.)
6.5.80 : 1 " à Périgné (G.B.)
29.9.80 : 2 " à Magny (M.F.)

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*)

3.4.80 : 1er contact auditif à Ardin (M.A.)
11.4.80 : 1er contact auditif à Repenou (M.F.)

HIBOU MOYEN DUC (*Asio otus*)

Quelques observations sur l'ensemble du département.

2.12.79 : 1 individu étang de la Guyonnière (J.M.B.)
26.1.80 : 3 " à Ardin (J.M.C.)
16.2.80 : 1 " trouvé mort sur la route au bois Chauvy (M.F.)
20.3.80 : 1 " à Chizé (J.M.B.)

MARTINET NOIR (*Apus apus*)

19.4.80 : 1ère observation à Juigny (M.F.)
25.4.80 : " " à Niort (M.A.)
2.9.80 : Dernière observation à Juigny (M.F.)

HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*)

7.4.80 : 1 individu au vol aux Habites (J.M.B.), idem à St Maxire (M.A.)
8.4.80 : 1ère observation à Juigny (2 individus) (M.F.)
7.9.80 : dernière observation " (M.F.)

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*)

5.4.80 : 1ère écoute à Niort (M.A.)
9.4.80 : entendu 1 individu à Niort (J.M.B.) idem le 10 & le 11.
du 1er au 15.8.80 : 1 chanteur à Périgné (G.B.)

PIC MAR (*Dendrocopos medius*)

18.2.80 : entendu 1 individu à Chizé (J.M.B.)
30.4.80 : idem

HIRONDELLE DE FENETFE (*Delichon urbica*)

6.10.79 : 6 individus , dernière observation de 1'année (M.F.)
4.3.80 : 1 individu à Ardin (R.Audurier)
19.3.80 : 1 " à Liez (85) (J.M.C.)
22.3.80 : 1 " à Nuchèze (G.B.)
1.9.80 : 1 " entièrement albinos à Etusson (J.Thuleau)

HIRONDELLE DE CHEMINEE (*Hirundo rustica*)

14.9.79 : 6 individus, dernière observation de 1'année (M.F.)
4.3.80 : 1 " à Ardin (R.Audurier)
19.3.80 : 1 " à Liez (85) (J.M.C.)
22.3.80 : 1 " à Nuchèze (G.B.)
1.9.80 : 1 " entièrement albinos à Etusson (J.Thuleau)

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*)

24.3.80 : 1ère observation de 1'année à Juigny (M.F.)
15.8.80 : 400 individus à Juigny (M.F.)

6.10.79 : 100 individus à Juigny, dernière observation de 1'année (M.F.)
4.4.80 : 4 " " " , 1ère
5.4.80 : 1ère observation à St Maxire (M.A.)
8.4.80 : " " à Niort (J.M.B.)

LORIOT JAUNE (*Oriolus oriolus*)

28.4.80 : 1 chanteur à Faye s/Ardin (J.M.B.)
30.4.80 : 1 individu à Moncoutant (G.B.)
1.5.80 : 1er chanteur à Niort (M.A.)

MESANGE NOIRE (*Parus ater*)

18.1.80 : 1 individu à Ardin (J.M.C.)

MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*)

9.1.80 : 2 individus au Busseau (M.A.)

MESANGE A MOUSTACHES (*Panurus biarmicus*)

Nombreuses observations à Juigny (M.F.)

30.6.80 : 1 individu : lère estivale pour la région (M.F.)

du 17.7. au 2.9. : 1 ♂ juvénile à Juigny (M.F.)

Nidification possible à Juigny.

SITELLE TORCHEPOT (*Sitta europaea*)

Nombreux nicheurs en forêt de Chizé (J.M.B.)

TICHODROME (*Tichodroma muraria*)

26.12.79 : 1 individu au château de Thouars (J.M.Houmeau)

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*)

23.3.80 : lère observation à Juigny (M.F.)

29.3.80 : 1 individu à Ste Blandine (J.M.B.)

26.9.80 : plusieurs individus à Ste Eanne (J.M.B.)

TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*)

Nombreuses observations dans le nord du département du 22.8 au 22.9.80 (M.F.)

14.5.80 : 1 individu ♀ à Vouillé (J.M.B.)

22.8.80 : 2 " à Juigny (M.F.)

16.9.80 : 3 " à Brunetières (M.F.)

5 " à Juigny (M.F.)

22.9.80 : 2 " " " (dernière observation 80)

TRAQUET PATRE (*Saxicola torquata*)

3.12.79 : 1 ♂ à Mazerolles (J.M.B.)

5.5.80 : 1 ♀ nourrissant au nid (M.F.) à Juigny

16.5.80 : 1 couple avec 2 juvéniles juste volants à Juigny (M.F.)

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*)

16.5.80 : 1 ♂ à Niort (J.M.B.)

21.6.80 : 1 ♂ à Beaurepaire (M.F.)

21.7.80 : 1 ♀ ou immature à Audefois (M.F.)

24.8.80 : 1 ♂ à Juigny (M.F.)

ROUGE QUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*)

23.10.79 : quelques individus à Chizé (J.M.B.)

9.5.80 : 1 ♂ + 2 ♀ alimentent ensemble un même nid (M.F.)

2.6.80 : la deuxième ♀ alimente seule un 2ème nid à Juigny (M.F.)

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*)

13.4.80 : 4 ♂ chanteurs à Juigny (M.F.)

19.4.80 : 1 ♂ " à Assais (G.B.)

20.4.80 : 1 ♂ " à Faye s/Ardin (J.M.B.)

LOCUSTELLE LUSCINOÏDE (*Locustella luscinioides*)

13.4.80 : lère observation à Juigny (M.F.)

Année 1980 : 1 couple nicheur à la Grue et 1 couple nicheur à Juigny (M.F.)

PHRAGMITE AQUATIQUE (*Acrocephalus paludicola*)

23.8.80 : 1 individu à Juigny (M.F.) idem le 31.8 et le 2.9.80.

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*)

14.4.80 : 1ère observation 3 ♂ chanteurs à La Grue (M.F.)

16.8.80 : dernière " 1 individu à Brunetières (M.F.)

Couples nicheurs pour l'année 1980 (sous-estimés) : 3 couples à la Grue (M.F.)
1 " à Repenou "
3 " à Juigny "

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*)

1.10.79 : dernière observation 1979 à Juigny (M.F.)

25.4.80 : 1ère " 1980 à Beaurepaire (M.F.)

11.8.80 : 2 individus dont 1 o chanteur (dernier chant 80) à Repenou (M.F.)

22.9.80 : dernière observation 1980 à Juigny (M.F.)

Couples nicheurs (sous-estimés) : 7 couples à Juigny, 1 à Beaurepaire, 1 à la Grue, 3 à Maumusson, 4 à Repenou, 1 à Brunetières, 1 à Audefois, Gripière et Grifférus.

ROUSSEROLLE TURDOIDE (*Acrocephalus arundinaceus*)

9.5.80 : 1 ♂ chanteur à la Grue (1ère observation 1980) (M.F.)

Couples nicheurs pour l'année 1980 (recensement à peu près complet) :

2 couples à Maumusson et Repenou, 1 couple à la Grue, Brunetières & Juigny (M.F.)

HYPOLAIS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*)

12.4.80 : 2 individus à Maumusson (donnée la plus précoce depuis 1968) (M.F.)

26.4.80 : 1 ♂ chanteur à Juigny (1er chant 1980) (M.F.)

29.6.80 : 1 couple nicheur à Ardin (M.A.)

Couples nicheurs près des étangs (M.F.) : 3 à La Grue, 2 à Beaurepaire, 1 à Juigny, Repenou, Maumusson et Vibreuil.

FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*)

Très nombreuses données pour l'ensemble de l'année dans le département.

27.6.80 : 1 juvénile juste volant à Magny (M.F.)

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*)

13.4.80 : 1ère observation 1980 : 1 o chanteur à Moutiers s/Argenton (M.F.)

14.4.80 : 1 ♂ chanteur à Juigny (M.F.) idem les 10.5, 24.5, 30.6.1980.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*)

Présente du 19.4.80 au 1.8.80 dans le nord du département.

26.4.80 : 4 ♂ chanteurs à Juigny (M.F.)

2.5.80 : plusieurs individus à Faye s/Ardin (J.M.B.)

1.8.80 : 1 ♀ ou juvénile à Brunetières (M.F.)

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*)

24.12.79 : 1 individu à Juigny (M.F.)

30.6.80 : Nombreux individus à Borcq s/Airvault (JMB, JMC, P.D.)

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*)

Nombreuses données pour l'ensemble du département à partir du 7.4.80.

7.4.80 : 1 individu chanteur à Niort (J.M.B.)

27.4.80 : 1 " plaine de Doux (G.B.)

9.5.80 : 1 " à Granzay "

12.5.80 : 1 " plaine de la Hausse Martin (M.Métais)

Couples nicheurs (probables) : au moins 5 couples à Juigny (M.F.) et 1 couple à Audefois (M.F.)

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*)

A noter plusieurs observations dans le nord du département (M.F.) ainsi qu'à Niort et ses environs (J.M.B.) durant toute l'année 1980.

- 1.12.79 : 1 individu à Niort (J.M.B.)
5.1.80 : 1 " à Juigny (M.F.)
21.7.80 : 1 o chanteur à Audefois (M.F.)
18/20.9.80 : 1 o " à Juigny "

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*)

- 24.3.80 : 1 individu à Juigny (M.F.)
7.4.80 : 1 " à Echiré (J.M.B.)
5.5.80 : 1 o chanteur à Magny (M.F.)

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*)

- 14.4.80 : 1 o chanteur à Périgné (J.C.Guérin)

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*)

- 22.4.80 : vu et entendu plusieurs individus à Chizé (J.M.B.)
28.4.80 : entendu 1 individu à Chizé (J.M.B.)

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*)

- 1 couple nicheur à Thouars : nourrissage le 10.7.80 (M.F.)
1 " " à Grifférus : " 28.7.80 "

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*)

- 25.4.80 : 1 o en plumage nuptial à Magny (M.F.)
17.9.80 : 1 individu à Juigny (M.F.)

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*)

- 4.4.80 : 1 individu à Juigny : 1ère observation à Juigny (M.F.)
14.4.80 : 50 " à La Grue (M.F.)
6 " à Juigny "
28.4.80 : 1 o chanteur à Chizé (J.M.B.)

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)

Observé du 13.11.79 au 25.4.80 dans le département.

- 30.9.80 : 1 individu à la Grue (1ère observation automnale) (M.F.)

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*)

- 18.8.80 : 2 individus à Juigny (M.F.)

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)

- Observé du 11.11.79 au 24.3.80 à Juigny (M.F.)
29.9.80 : 1 individu à Beaurepaire (1ère observation automnale) (M.F.)

BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*)

Passage du 4.4.80 au 5.5.80 puis présente dans les égangs du nord du 2.2.80 au 28.9.80 (M.F.)

- 23.10.79 : 1 individu en forêt de Chizé (J.M.B.)
4.4.80 : 15 " à Juigny (13 flavéoles, 2 types (M.F.))

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)

- Plusieurs observations d'hivernants (Niort, étang de Juigny)
20.6.80 : 1 couple nicheur à Grifférus (M.F.)
21.6.80 : 1 " " à Beaurepaire "

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)

- Tout l'hiver, présence d'un énorme dortoir à Niort (voir article de M.A.)
16.9.80 : 250 individus en dortoir à La Grue (M.F.)

BERGERONNETTE DE YARREL (*Motacilla alba Yarrellii*)

Espèce observée tout l'hiver à la Tiffardière et au dortoir de Niort.

PIE GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*)

1.10.79 : 1 ♀ ou immature à Juigny (M.F.) (observation la plus tardive depuis 1968)

Plusieurs couples nicheurs dont 3 couples à Juigny.

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*)

4.5.80 : 1 individu à Béceleuf (M.A.)

8.6.80 : 1 " à Faye s/Ardin (J.M.B.)

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*)

Plusieurs observations à Juigny (M.F.) dont :

30.12.79 : 1 ♂ chanteur à Juigny (M.F.)

21.6.80 : 1 " " à Beaurepaire (M.F.)

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*)

12.5.80 : 1 ♂ chanteur à Vouillé (M.Métais)

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*)

Plusieurs observations du 1.11.79 au 25.4.80 (M.F.) dont :

24.3.80 : 5 ♂ chanteurs à Juigny (M.F.)

18.4.80 : 1 couple à la Grue "

BRUANT NAIN (*Emberiza pucilla*)

9.2.80 : à Juigny, 1 individu picorait avec 5 bruants des roseaux sur une place d'agrainage à canards. Taille d'une linotte (nettement plus petit que le bruant des roseaux) calotte rousse encadrée de 2 traits blancs, joues roussâtres soulignées d'un trait blanc, 2 traits pâles sur les côtés du dos, couleurs sensiblement plus chaudes que le bruant des roseaux. (M.F.)

13.3.80 : idem : même oiseau ?

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)

16.11.79 : 100 individus en forêt de Chizé (J.M.B.)

12.1.80 : 2 " à La Chapelle St Laurent (J.M.B., J.M.C.)

1.2.80 : plusieurs individus à Chizé (J.M.B.)

SERIN CINI (*Serinus serinus*)

Plusieurs observations du 22.12.79 au 21.4.80 à Niort et ses environs.

2.2.80 : 3 individus à Niort (M.A.)

6.4.80 : 1 ♂ à Faye s/Ardin (J.M.B.)

21.4.80 : 1 couple à Niort (J.M.B.)

GROS BEC (*Coccothraustes coccothraustes*)

16.11.79 : 3 individus en forêt de Chizé (J.M.B.)

21.7.80 : 1 " " " " " (juvénile juste volant, trouvé mort).

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*)

Nicheur à Villiers en Bois (J.M.B.)

ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*)

21.7.80 : 200.000 individus en dortoir à la Grue (M.F.)

CORNEILLE MANTELEE (*Corvus corone* (groupe *cornix*))

30.12.79 : 1 individu avec une bande de freux à Juigny (M.F.)

CINGLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*)

23.2.80 : 1 individu à Grifférus (P.Philippon)

A noter également de nombreuses observations des espèces suivantes dont le détail ne peut figurer ici faute de place :

Pigeon ramier - Tourterelle turque - Perdrix rouge et grise - Chouettes ef-
fraie, hulotte, chevêche - Martin Pêcheur - Pic vert, épeiche, épeichette -
Flouettes des champs, lulu, cochevis huppé - Corneille noire - Corbeau freux -
Choucas des tours - Pie bavarde - Mésanges charbonnière, bleue, nonnette, à
longue queue - Grimpereau des jardins - Trogloäyte - Grive musicienne, draine,
mauvis, litorne - Rouge-gorge - Bouscarle de Cetti - Roitelets à triple bandeau
et huppé - Accenteur mouchet - Verdier - Chardonneret - Bouvreuil - Pinsons
des arbres - Bruants jame et zizi - Moineaux domestique et friquet.
